

DIPTRÓN[®]

100 mg/ml
Solución Spot-on para perros
Solução para unção punctiforme para cães

DIPTRON 100 mg/ml. Solução para unção punctiforme para Cães. Fipronil.

DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ACTIVAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS

Cada ml contém:

Substância Activa: Fipronil 100 mg

Excipientes: Butilhidroxianisol (E320) 0,2 mg, Butilhidroxitoulano (E321) 0,1 mg

FORMA FARMACÊUTICA: Solução para unção punctiforme "Spot-On".

ESPÉCIES-ALVO: Caninos (Cães).

INDICAÇÕES: Para o tratamento e prevenção de infestações por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) e carrças (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp.) e como parte de uma estratégia de tratamento para o controlo da Dermatite Alérgica à Picada de Pulga, quando esta tenha sido previamente diagnosticada pelo médico veterinário responsável.

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Antes de utilizar, leia o folheto informativo. Solução para unção punctiforme "Spot-On".

- 1 pipeta de 0,67 ml por cão com peso superior a 2kg e até 10kg de peso corporal. Cães pequenos.
- 1 pipeta de 1,34 ml por cão com peso superior a 10kg e até 20kg de peso corporal. Cães médios.
- 1 pipeta de 2,68 ml por cão com peso superior a 20kg e até 40kg de peso corporal. Cães grandes.
- 1 pipeta de 4,02 ml por cão com peso superior a 40kg e até 60 kg de peso corporal. Cães muito grandes.

Modo de administração: Manter a pipeta na posição vertical. Antes de partir a extremidade assegurar que todo o conteúdo se encontra dentro do corpo principal da pipeta. Partir a extremidade da pipeta seguindo a linha gravada. Afastar os pêlos do dorso do animal, na base do pescoço, na linha das escápulas, até que a pele fique bem visível. Aproximar a ponta da pipeta junto à pele e apertá-la delicadamente em um ou dois pontos, para esvaziar completamente o seu conteúdo directamente sobre a pele. Aquando da aplicação do medicamento veterinário na pele, evitar molhar excessivamente o pelo, dado que a área tratada pode ficar com aspecto molhado ou oleoso após a aplicação. Se este efeito ocorrer, desaparecerá nas 24 horas após a aplicação. Na ausência de estudos de segurança, o intervalo mínimo entre os tratamentos é de 4 semanas.

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não aplicável.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Conservar na embalagem de origem. Conservar a temperatura inferior a 30°C

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO: Eliminar os desperdícios de acordo com a legislação em vigor. Eliminação: ler o folheto informativo.

Medicamento veterinário não sujeito a receita médico-veterinária.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO: 765/01/14DFVPT



Peso corporal	Dosagem
2 - 10 Kg.	▶ Pipeta 0,67 ml
10 - 20 Kg.	▶ Pipeta 1,34 ml
20 - 40 Kg.	▶ Pipeta 2,68 ml
40 - 60 Kg.	▶ Pipeta 4,02 ml



Embalagem



Cães pequenos



Cães médios



Cães grandes



Cães muito grandes

Embalagens

Expositores



FLYINGVET 