


# CARBOVITAL

125 ml  
1 litro

- **Captação de substancias indesejáveis**
- **Regulação do transito intestinal**
- **Correcção dos estados flatulentos**
- **Fácil administração**



Laboratoire MOUREAU  
33 rue Charles de Gaulle  
95270LUZARCHES



## A eficácia comprovada do carvão vegetal activado

Substancia – Adsorção <i>In Vitro</i>	Quantidade adsorbida	Referências
Estriquinina nitrato	950	Andersen (1946)
Malatião	310	Hayden et Comstox (1975)
Cianeto de potássio	35	Andersen (1946)
Barbituricos (sais de sódio)	300 - 350	Andersen (1946)
Aspirina (p-H 1,0)	280	Hayden et Comstox (1975)
Salicilato de sódio (p-H 1,0)	490	Hayden et Comstox (1975)
Atropina sulfato	700	Hayden et Comstox (1975)
Clorpromazina cloridrato	360	Hayden et Comstox (1975)
Prométazina cloridrato	330	Hayden et Comstox (1975)
Fenilpropanolamina	100	Tsuchiya et Levy (1972)
Clorêto de mercúrio	1800	Andersen (1946)
Etanol	300	Andersen (1946)

### Composição

- Carvão vegetal activado: 20 gramas
- Excipiente especial q.b. 100 ml.

### Superfície específica

A capacidade de captação do carvão vegetal activado é directamente proporcional á sua superfície específica. A superfície específica do CARBOVITAL é muito elevada, na ordem de 1.000 m<sup>2</sup> / g.

### Resíduos

CARBOVITAL é completamente biodegradável e ecológico.

### Indicações

Favorece a captação das substâncias indesejadas ao nível do lúmen do tubo digestivo. Auxilia na regularização do trânsito intestinal e de la digestão (flatulências).

### Modo de emprego

**Administração por via oral, agitar bem a embalagem antes de usar.**

- Auxilio à captação de substâncias indesejadas : 1g de carvão activado / kg de peso vivo, o equivalente a 5 ml de CARBOVITAL por kg de peso vivo. Repetir a administração se necessário repetir passadas 4 a 6 horas.
- Regulação do trânsito intestinal (diarreias neonatais e alimentares) e correcção dos estados flatulentos (timpanismo): 1 g de carvão activado / 10 kg de peso vivo de manhã e à noite, o equivalente a 5 ml de CARBOVITAL por cada 10 kg de peso vivo, até ao retorno à normalidade.
- Diarreias neonatais e alimentares:
  - Leitões (1 a 5 kg) como preventivo - 2 ml/kg/ dia
  - Porcos (60 kg) – 1,5 ml/kg
  - Vitelos – 2 ml/kg

### Apresentação

- Frasco com 125 ml
- Frasco com 1 litro e de 5 litros

Distribuído em Portugal por:

FLYINGVET LDA – Apartado 1022 – Santana, 2971-907 Sesimbra

☎ - 00351-212686855 / 📠 - 00351-212680467 / 💻 [www.flyingvet.pt](http://www.flyingvet.pt) / [info@flyingvet.pt](mailto:info@flyingvet.pt)